

## **ОТЗЫВ**

**официального оппонента доктора медицинских наук, профессора  
Овчинникова Андрея Юрьевича на диссертационную работу Боджокова  
Алия Адамовича на тему «Клинико-диагностические параллели  
состояния околоносовых пазух и глоточной миндалины у детей»,  
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских  
наук по специальности 3.1.3. Оториноларингология.**

### **Актуальность темы.**

В последние годы отмечается рост числа детей с заболеваниями органов лимфоглоточного кольца. Распространенность хронической формы аденоидита (ХА) варьирует от 37 до 70% случаев, а гипертрофия глоточной миндалины выявляется у трети всей детской популяции в мире, при этом аденотомия является самой частой хирургической операцией, проводимой детям. На сегодняшний день нет единого понимания этиологии хронического воспаления лимфоидной ткани носоглотки у детей. Существует мнение, что, сочетанное воздействие бактериальной флоры, а также респираторных и лимфотропных вирусов на фоне селективной иммунологической недостаточности является основной причиной развития хронического воспаления и клинически значимой гипертрофии глоточной миндалины. Таким образом, цель исследования, поставленная автором, определение особенности влияния топографо-анатомического расположения глоточной миндалины и ее роль в формировании хронического воспаления, на основе комплексного клинического обследования детей с хроническими и рецидивирующими риносинуситами является крайне актуальной.

В представленном исследовании продемонстрирована роль глоточной миндалины и ее топографо-анатомические варианты в развитии патологических процессов околоносовых пазух. Данные подтверждены комплексом функциональных, клинических, лучевых, психологических и эндоскопических

исследований, охватывающих целый спектр патогенетических направлений. Достоинством работы является и то, что автор рассматривает изучаемую проблему комплексно, с позиции психиатрии и междисциплинарного взаимодействия смежных специалистов. Это не только расширяет представление об изучаемом явлении, но и имеет прикладное значение, поскольку отражается в формировании лечебных и профилактических мероприятий больных с сочетанной патологией.

Большое значение имеет обоснованный алгоритм ведения детей группы риска развития рецидивирующего и хронического риносинусита, позволяющий точно и без временных затрат определить тактику персонализированного медицинского сопровождения пациента.

#### **Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.**

Использование результатов проведенного исследования гипертрофии глоточной миндалины в сочетании с хроническим/рецидивирующим риносинуситом позволяет оценить в комплексе клинические проявления данной патологии и сформировать индивидуализированный подход в тактике лечения.

Результаты эндоскопии полости носа и носоглотки дополненные данными объективной лучевой диагностики позволяют определить топографо-анатомические особенности глоточной миндалины, состояние остиомеатального комплекса и оценить их роль в формировании хронического/рецидивирующего риносинусита у детей и подростков. Использование анкетирования как предварительного оценочного теста, характеризующего клинические проявления назальной обструкции при гипертрофии глоточной миндалины, качество жизни и психо-эмоциональные ощущения ребенка, позволяет расширить диагностический алгоритм и повысить достоверность контроля над состоянием пациента в динамике.

## **Содержание и оформление диссертации**

Работа Боджокова А.А. написана и оформлена в традиционном стиле и состоит из введения, обзора научной литературы, главы материалы и методы исследования, 3 глав собственных исследований, аналитического заключения, выводов, практических рекомендаций, списка цитируемой научной литературы, включающего 54 отечественных и 101 зарубежных источников. Она изложена на 110 страницах машинописанного текста, иллюстрирована 30 таблицами, 31 рисунками, которые логично дополняют текстовое содержание работы.

**Во введении** представлено комплексное обоснование актуальности исследования роли топографо-анатомических характеристик глоточной миндалины в патогенезе хронического и рецидивирующего риносинусита в детской возрастной группе. Сформулированы цель и конкретные задачи исследования, определены основные положения, выносимые на защиту. Изложены научная новизны, отражена практическая значимость полученных результатов, а также приведены данные о внедрении разработок в клиническую практику.

**В первой главе** проведенный анализ обзоры литературы отражает системный подход к изучению современных научных концепций, касающихся проблемы хронического и рецидивирующего риносинусита у детей, ассоциированного с гипертрофией глоточной миндалины. Автор последовательно аргументирует актуальность исследования, акцентируя внимание на высокой эпидемиологической распространенности и медико-социальной значимости патологии, а также на отсутствии унифицированных алгоритмов диагностики и терапии. В результате обобщения литературных данных выявлены ключевые дискуссионные и малоизученные аспекты проблемы, что сформировало методологический фундамент для определения цели и задач собственного исследования.

**Во второй главе** диссертационной работы детально изложены дизайн исследования, а также комплекс клинических и инструментальных методов, примененных в работе. Анализ представленных материалов свидетельствует о высоком методическом уровне проведения исследования.

Сформулированы критерии формирования и характеристики исследуемых групп, общая выборка которых составила 132 пациента. Статистическая обработка полученных количественных данных осуществлялась с использованием как параметрических, так и непараметрических методов статистического анализа. Достоверность наблюдаемых различий была статистически подтверждена.

Примененная методологическая схема являлась релевантной поставленным цели и задачам работы, что обеспечивало валидность и объективность полученных научных результатов и выводов.

**Третья и четвертая главы** в диссертационной работе содержат детальный анализ клинических характеристик исследуемой когорты пациентов, результаты оценки субъективной симптоматики, а также данные, полученные с применением инструментальных и клинико-функциональных методов диагностики.

Эндоскопическая оценка по адаптированной шкале Lund-Kennedy показала статистически значимое уменьшение воспалительных изменений в послеоперационном периоде. На 3–4 сутки после операции средний балл в группе А составил 4,945 ( $\pm 1,025$ ), в группе В — 3,745 ( $\pm 0,842$ ); через 1 месяц — 1,424 ( $\pm 0,621$ ) и 0,898 ( $\pm 0,661$ ) соответственно ( $p = 0,000$ ). Топографический анализ выявил доминирование медиального расположения ГМ с полным закрытием сошника и пролабированием в хоаны (вариант IV) у 67,3% пациентов группы В2 и 44,1% — группы А2.

Анкетирование по опроснику SN-5 и визуально-аналоговой шкале (ВАШ) показало, что 58% пациентов группы А и 63% группы В оценивали своё состояние как неудовлетворительное ( $\geq 6$  баллов по ВАШ). После проведенного хирургического лечения отмечена положительная динамика: большинство

пациентов указали на отсутствие симптомов или их минимальную выраженность.

Заключение написано в виде краткого изложения основных результатов диссертационной работы. Полученные данные подчеркивают важность комплексной оценки топографо-анатомических особенностей ГМ и клинико-статистического анализа для оптимизации диагностики и лечения риносинуситов у детей.

Выводы диссертации обоснованы и логически вытекают из результатов исследования.

Практические рекомендации подчеркивают необходимость уделять внимание анатомо-топографическому положению глоточной миндалины у пациентов с хроническим риносинуситом перед проведением хирургического лечения.

Все четыре вывода соответствуют поставленным задачам для достижения целей исследования. Практические рекомендации отражают прикладное значение выполненной работы.

Последовательность изложения полученных материалов в результате проведенного исследования систематизирована, данные подвергнуты статистическому анализу. Основные результаты исследования достаточно представлены в печати. По теме диссертационной работы имеется три публикации, три в журналах рекомендованных ВАК.

### **Ценность для науки и практики результатов работы**

Практическую ценность имеет внедрение анкетирования по клиническим проявлениям назальной обструкции при гипертрофии глоточной миндалины, ее влияния на качество жизни, психоэмоциональное состояние пациентов позволит врачам общей практики, педиатрам и семейным врачам оказывать необходимую помощь на ранних стадиях развития патологического процесса, а также оценивать результативность проведенного лечения. Применение адаптированной

шкалы оценки эндоскопической картины в комплексе с данными лучевой диагностики у детей с хроническим и рецидивирующим риносинуситом позволяют оценить анатомо-топографические особенности глоточной миндалины, что крайне важно для диагностики, лечения и динамического наблюдения за пациентами.

### **Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной печати.**

По теме диссертации опубликованы 3 печатные работы, из которых 3 - работы в научных изданиях, включенных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ в перечень изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации и перечень ФГБУ ФМБА НМИЦО.

Основные положения диссертации доложены на 10 научно-практических конференциях различного уровня.

### **Соответствие содержания основным положениям диссертации.**

При оценке изложения результатов исследования и стиля диссертации, следует отметить, что диссертационная работа построена по традиционному принципу и включает в себя введение, обзор литературы, описание материалов и методов исследования, собственные результаты, изложенные в 3 главах, а также заключение, выводы, практические рекомендации по применению результатов исследования и приложения. Материал диссертационной работы изложен в соответствии с целью и задачами исследования и полностью раскрывает тему в соответствии с современными требованиями.

Диссертационная работа выполнена на достаточно высоком методологическом уровне, стиль написания доступный для усвоения изложенного материала. Полученные результаты проанализированы в соответствии с требованиями и представлены для наглядности в таблицах и диаграммах. Выводы, полученные по результатам работы, соответствуют исследованному материалу и

свидетельствуют о научной зрелости диссертанта.

### **Замечания по работе.**

При анализе диссертационной работы Боджокова А.А. обращает на себя внимание ряд недостатков: стилистические ошибки и ряд нарушений в пунктуационном и грамматическом строе.

Несмотря на высказанное замечание в целом оно не снижает научно-практической значимости исследования и не влияет на положительную оценку диссертационной работы в целом.

Таким образом, диссертационная работа Боджокова Алия Адамовича «Клинико-диагностические параллели состояния околоносовых пазух и глоточной миндалины у детей» представляет интерес в практическом значении.

### **Заключение**


Диссертационная работа Боджокова Алия Адамовича на тему «Клинико-диагностические параллели состояния околоносовых пазух и глоточной миндалины у детей», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 3.1.3. Оториноларингология, является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на высоком методическом уровне, и представляет собой цельное, законченное научное исследование.

Учитывая высокий уровень методов функционального исследования в представленной диссертационной работе и широкий спектр используемых средств для достижения решения поставленных задач, а также уже полученные результаты исследования, представленная работа представляет интерес как у научном плане, так и как исследование, имеющее практическое применение.

Диссертационная исследование Боджокова Алия Адамовича на тему «Клинико-диагностические параллели состояния околоносовых пазух и глоточной миндалины у детей», является законченной научно-

квалификационной работой в котором на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения и решена значимая научная проблема - новых подходов в диагностике и лечения гипертрофии глоточной миндалины с сопутствующем хроническим и рецидивирующим риносинуситом. По своей актуальности, новизне, научно - практической значимости, диссертация Боджокова Алия Адамовича на тему «Клинико-диагностические параллели состояния околоносовых пазух и глоточной миндалины у детей» полностью соответствует всем требованиям п.9, п. 10 раздела II «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. №842 (в ред. от 16.10.2024г.) «О порядке присуждения учёных степеней», предъявляемых к кандидатским диссертациям, а её автор Боджоков Алий Адамович, достоин присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 3.1.3. Оториноларингология


Заведующий кафедрой оториноларингологии  
ФГБОУ ВО «Российский университет  
Медицины» МЗ РФ, д.м.н., профессор



А.Ю. Овчинников

Подпись А.Ю. Овчинникова заверяю:

Ученый секретарь ФГБОУ ВО «Российский университет  
Медицины» МЗ РФ, д.м.н., профессор



Ю.А. Васюк

« 06 » 09 2025 г.